

NOTE PRÉLIMINAIRE SUR UNE COLLECTION DE REPTILES  
RECUEILLIE PAR M. HAUG À LAMBARÉNÉ,

PAR M. F. MOCQUARD.

M. Haug, missionnaire protestant, a récemment fait don au laboratoire d'herpétologie du Muséum d'une collection de Reptiles du Gabon, recueillie par lui dans les environs de Lambaréné, sur le bas Ogooué.

\* Cette collection comprend quarante et une espèces de Reptiles et six de Batraciens; elle offre de l'intérêt et fera l'objet d'un mémoire détaillé. Je ne bornerai ici à mentionner quelques espèces rares ou peu communes et à donner les diagnoses de quelques autres qui me paraissent nouvelles.

Parmi les premières, je signalerai *Chamæleon cristatus*, Stutchbury; *Chamæleon Oweni*, Gray; *Rhampholeon spectrum*, Buchholz; *Lacerta echinata*, Cope; *Lygosoma Reichenowi*, Peters, celle-ci figurant pour la première fois dans la collection du Muséum; *Grayia ornata*, Bocage (= *Gr. furcata*, Mocquard), encore confondue par quelques naturalistes avec *Gr. Smythii*, Leach; *Gonionotophis Brussauxi*, Mocq. (= *G. Vossii*, Boettger), et *Boulengerina annulata*, Buchh. et Peters, considérée jusqu'ici et à tort comme appartenant au genre *Naja*.

Voici, d'autre part, les noms et les diagnoses des espèces qui me paraissent nouvelles.

1. **Poromera Haugi**, n. sp.

Cette espèce diffère de *Poromera Fordii*, Hallowell, par ses deux écailles postnasales superposées et ses écailles préanales nombreuses et subégales, au lieu d'une grande plaque unique comme chez *P. Fordii* et les *Tachydromes*.

2. **Polemon Bocourti**, n. sp.

Voisine de *P. Barthii*, Ian, cette espèce s'en distingue par deux postoculaires au lieu d'une seule, et le nombre moins élevé des gastrostéges (199 à 202 au lieu de 221 à 226).

3. **Atractaspis Boulengeri**, n. sp.

A pour caractères distinctifs : un museau large et arrondi, une frontale grande, un peu plus longue que large, beaucoup plus longue que sa distance de l'extrémité du museau; une préoculaire et une postoculaire; une très grande temporale intercalée entre la 4<sup>e</sup> et la 5<sup>e</sup> supéro-labiale, la postoculaire et la pariétale; 5 supéro-labiales, dont la 4<sup>e</sup> est la plus haute; une mentonnière en contact avec les plaques sous-maxillaires antérieures; la 3<sup>e</sup> labiale inférieure très grande; 21 séries d'écailles, 195 gastrostéges et 24 urostéges toutes simples; l'anale entière.

Coloration d'un brun ardoisé uniforme en dessus, plus clair sous le ventre.

4. *Arthroleptis gabonensis*, n. sp.

Cette espèce a des affinités évidentes avec *Arthr. calcaratus*, Peters; mais elle en diffère par une grosse papille linguale conique, par son tympan distinct, par les nombreuses saillies verruqueuses et les replis glandulaires qu'on observe sur la face dorsale, ainsi que par l'absence de saillie spiniforme sur l'extrémité postérieure de la paupière supérieure.

5. *Rappia tuberculata*, n. sp.

Cette espèce de *Rappia* me paraît également bien voisine de *R. salinae*, Bianconi, originaire de Mozambique. Elle s'en distingue cependant par ses tubercules dorsaux, ses disques digitaux plus développés, l'invagination du sac vocal de chaque côté d'un large raphé médian, et par sa coloration. Au lieu d'un brun grisâtre uniforme en dessus, *R. tuberculata* est d'un brun roussâtre, avec une bande anguleuse brune entre les yeux, de courtes barres transversales sur l'extrémité distale de l'avant-bras, sur la jambe, l'articulation tibio-tarsienne et le tarse; l'aîne, les faces interne et externe de la cuisse, ainsi que la face interne de la jambe sont couleur de chair; enfin deux raies brunes, une de chaque côté, partent de l'œil pour aboutir à l'aîne, en décrivant sur les flancs et les parties latérales du dos des inflexions symétriques, brusques et très étendues.

---

REMARQUES ANATOMIQUES SUR LES SQUALES OBSERVÉS  
PENDANT LA DERNIÈRE CAMPAGNE DU YACHT PRINCESSE-ALICE,

PAR M. H. NEUVILLE.

S. A. le Prince de Monaco ayant bien voulu m'admettre à bord de son navire, je me suis trouvé à même d'y poursuivre, dans des conditions exceptionnellement favorables, mes recherches anatomiques sur les Squales. Je lui en exprime ici toute ma reconnaissance, et j'exposerai brièvement les principaux résultats auxquels je suis parvenu.

Ces recherches ont été faites à bord, après chaque pêche, et je les continue au laboratoire d'Anatomie comparée sur des pièces données au Muséum par le Prince de Monaco.

Elles ont porté, d'une part, sur les Squales de zone côtière ou littorale, pris dans la Méditerranée (mouillage de l'île d'Alboran) et dans l'Atlantique (parages des Açores), lesquels se rapportent aux genres : *Scyllium*, *Galeus*, *Carcharias*. et *Zygæna*. Je puis ainsi, en généralisant mes précédents travaux, confirmer les résultats en partie publiés dans le *Bulletin du Muséum* (1896, n° 4). Dans ces différents genres j'ai toujours retrouvé la veine